

Inoplectus ¹⁾ *Beraneki* n. sp.

Elongatus, depressus, nitidus, glaber, obsolete longitudinaliter alutaceus, testaceo-piceus, antennarum basi, pedibus elytrisque dilutioribus; capite maximo, thorace latiore, subrotundato, plano, lateribus punctis tribus setiferis impressis, prope oculos longitudinaliter sulcato, mandibulis prominulis, antennis sat robustis, thoracis basin perparum superantibus, articulis 5 penultimis obconico-subquadratis; prothorace subcordato, longitudine fere latiore, basin versus fortiter angustato, plano, vix canaliculato, lateribus pone medium denticulo parvo instructo, punctis tribus aut quatuor, margine antico utrinque punctis tribus setiferis impressis; scutello semicirculari; elytris latitudine paulo longioribus, apicem versus latioribus, planis, humeris obtusis lateribus punctis pluribus, dorso medio puncto singulo setiferis impressis; abdominis segmentis dorsalibus sex liberis, quatuor primis aequae longis, quinto sextoque longioribus, ultimo angusto, triangulari; lateribus tenuissime marginatis, punctis pluribus, longe piliferis impressis. — Long. 3.5 mill.

Durch die eintönige braungelbe Färbung, sehr großen Kopf und die zahlreichen, zum Theil auf der Dorsalfläche des Körpers stehenden borstentragenden Punkte von den indischen Arten recht ausgezeichnet.

Diese Art fand Hr. Jul. Beranek, Professor an der höheren landwirthschaftlichen Landeslehranstalt in Tabor, dem ich sie widme, in aus Manilla stammendem Tabak.

¹⁾ *Inoplectus* Smith. = *Ino* Casteln. Der letztere Name ist jedoch schon früher vergeben.

Edm. Reitter.